

# დედათა სიკვდილიანობის ეპიდკვლევა, 2015


დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის  
სამმართველო

ლელა შენგელია MD., MPH

დალი ტრაპაიძე MD



# დედათა სიკვდილიანობა, 1990-2015



# მეთოდი

რეტროსპექტული და აღწერილობითი  
კვლევა დაფუძნებული დედათა  
სიკვდილიანობის აქტიური  
ზედამხედველობის პრინციპებზე.



# კვლევის ინსტრუმენტები

- სამედიცინო დოკუმენტაციის მიმოხილვა;
- ინფორმაციის მოპოვება გარდაცვლილი ქალის ოჯახში ვერბალური აუტოფსიის კითხვარით;
- ჩაღრმავებული ინტერვიუ სამედიცინო პერსონალთან;
- ოჯახური შინამეურნეობების შესწავლა შემოსავლების მიხედვით, მათი კვინტილებად დაყოფის გზით.

# კვლევის შედეგები

24 ორსულის სავარაუდო სიკვდილი

- 21 (87.5%) იქნა კლასიფიცირებული როგორც სიკვდილი - დაკავშირებული ორსულობის, მშობიარობისა და ლოგინობის ხანის გართულებებთან;
- 3 (12.5%) კლასიფიცირებულ იქნა, როგორც უბედური შემთხვევა.


# კვლევის შედეგები (1)

- 19 (90%) შემთხვევაში დადასტურდა დედის ადრეული სიკვდილი;
- 2 (10%) შემთხვევაში დადგინდა დედის გვიანი სიკვდილი.

## კვლევის შედეგები (2)

- ადრეული სიკვდილის 3 შემთხვევა დაფიქსირდა ბინაზე;
- 16 შემთხვევა რეგისტრებული იქნა სტაციონარში.

# დედათა სიკვდილიანობის მიზეზები, საქართველო, 2015





## კვლევის შედეგები (3)

- ❖ 16 საკურო კვეტა;
- ❖ ორი ფიზიოლოგიური მშობიარობა;
- ❖ დედა გარდაიცვალა ნაყოფთან ერთად;
- 13 შემთხვევაში მშობიარობა დასრულდა ცოცხალი ნაყოფით;
- 4 მკვდარი ნაყოფით;
- ერთ შემთხვევაში დაფიქსირდა ადრეული ნეონატალური სიკვდილი;
- ✓ გარდაცვალებათა 26 % განხორციელდა რეფერალი.

## კვლევის შედეგები (4)

- 31.5% - 24 წელზე ნაკლები ასაკობრივი ჯგუფი;
- 31.5% - 25-30 წ.წ. ასაკობრივი ჯგუფი;
- 26% - 31-40 წ.წ. ასაკობრივი ჯგუფი;
- 11% - დედის ასაკი აღემატებოდა 41 წელს.

## კვლევის შედეგები (5)

- 2015 წელს გარდაცვლილ დედათა აბსოლუტური უმრავლესობა სარგებლობდა ანტენატალური მეთვალყურეობით;
- გარდაცვლილთაგან 78.9 %-მა გაიარა 4 ან მეტი ანტენატალური ვიზიტი.

## კვლევის შედეგები (6)

- 42% დიასახლისი (საშუალო და დაწყებითი განათლებით);
- 47% მუშაობდა სახელმწიფო ან კერძო სექტორში (საშუალო და უმაღლესი განათლებით);
- 11% სტუდენტი.

# სოციალური დეტერმინანტები

სოციალური დეტერმინანტები შესწავლილი იქნა 24 შემთხვევაში.

- 54% გარდაცვლილთა ოჯახები მიეკუთვნებოდა დაბალი შემოსავლების კვინტილს,
- 46% თანაბრად გადანაწილდა შემოსავლების II და III კვინტილზე.



ეპიდკვლევის მონაცემებით დედათა  
სიკვდილიანობის მაჩვენებელმა 2015 წელს  
შეადგინა 32/100 000 ცოცხალშობილზე.



# რეკომენდაციები

- ანტენატალური მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება;
- უწყვეტი პროფესიული განათლების სისტემის დანერგვა;
- გარე და შიდა კლინიკური აუდიტის დანერგვა ქვეყანაში;
- მოსახლეობის განათლების დონის ამაღლება რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროში.