

# წითელა: ზოგადი პრაქტიკის მართვის სახელმძღვანელო



შესაძლო/საექვო წითელა?

**მინიმუმამდე შეამცირეთ სამედიცინო დაწესებულებაში დაავადების გადაცემის რისკი**

- წითელა ძალიან მაღალი კონტაგიოზობის მქონე დაავადებაა, გადაცემის აეროგენული მექანიზმით.
- შესაძლო/საექვო შემთხვევები, შეძლებისდაგვარად, გასინჯეთ ბინაზე ვიზიტით.
- შესაძლო/საექვო შემთხვევა მთარსდეთ საერთო მოსაცდელს (გამოიყენეთ სხვა შესასვლელი).
- კონსულტაცია გაუწიეთ ისეთ ოთახში, რომელიც თავისუფალი იქნება მომდევნო 30 წუთის განმავლობაში.

**თანხვედრაშია თუ არა შემთხვევა წითელას კლინიკური შემთხვევის განმარტებასთან?**

დაავადება **ორივე** ქვემოთ ჩამოთვლილით:

- გენერალიზებული წარმოშობის მაკულო-პაპულოზური გამონაყართ (რომელიც გრძელდება 3 ან მეტი დღე)
- ცხელება ( დაახლოებით 38°C) გამონაყარის დაწყების დროს.

**და** მინიმუმ ერთით:

- ხველა ან რინიტი, ან კონიუქტივიტი, ან კოპლიკის ლაქები

**არა**  
**დაახ**

- მართე, როგორც კლინიკური ჩვენება
- დიფერენციალური დიაგნოზი: გაითვალისწინეთ წითურა, ადამიანის პარვოვირუსი B19, ენტეროვირუსი, აივ ინფექცია, ადენოვირუსი ან არბოვირუსული ინფექცია, ჩვილთა როზეოლა, ქუნთრუშა, მედიკამენტოზური რეაქცია, კავასაკის დაავადება.

**შეტყობინება სასწრაფოდ**

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ტერიტორიულ მუნიციპალურ ცენტრს (სჯც) ან დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს (დკსჯეც)

**ლაბორატორიული ტესტირება**

- ხელი შეუწყეთ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მუნიციპალური და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლებს, ადექვატური სინჯების\* შეგროვებაში

*შენიშვნა: სეროლოგიური კვლევისთვის სისხლის ნიმუშის აღება ხდება გამონაყარის დაწყებიდან 4-28 დღის შუალედში.*

\*სასურველი ნიმუშების შესახებ კონსულტაცია გაიარეთ სჯც-სა და დკსჯეც-ს სპეციალისტებთან

**შემთხვევების მართვა**

- დაუყოვნებლივ მოახდინეთ შემთხვევის იზოლირება
- დაითხოვეთ ბაღიდან / სკოლიდან / სამუშაო ადგილიდან გამონაყარის დაწყებიდან სულ მცირე 4 დღის განმავლობაში.
- უზრუნველყავით მხარდაჭერი და გართულებების მკურნალობა.

წითელას ლაბორატორიული ტესტირების დადებითი პასუხი?

**არა**  
**დაახ**

შემთხვევის მართვისა და იზოლაციის საჭიროების გადახედვა

**იმუნიზაცია**

შეამოწმეთ სხვა პაციენტებისა და პერსონალის წითელას ვაქცინაციის სტატუსი

იმუნიზაციის მოდული

<http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/Default.aspx>

**კონტაქტების მართვა**

- განიხილეთ კონტაქტად ყველა, ვინც კი გაიზიარა ჰაერი შემთხვევასთან/დაავადებულთან (გადამდებლობის პერიოდში) ან შემთხვევის ვიზიტადან 30 წუთის განმავლობაში. ინფიცირებულები გადამდებად ითვლებიან გამონაყარის დაწყებამდე 4 დღის და გამონაყარის დაწყებიდან 4 დღის განმავლობაში.
- დაიწყეთ კონტაქტირებულთა ვაქცინაცია (უკუჩვენების არ არსებობისას) თუ:
- არაა დოკუმენტირებული მტკიცებულება, რომ კონტაქტირებული ვაქცინირებულია წითელას კომპონენტთან ვაქცინით;
- არ არსებობს სეროლოგიური მტკიცებულება წითელას გადატანის შესახებ.